Glossaire

Avifaune : Ensemble des espèces d'oiseaux d'une région donnée.

Berme : Partie non roulable de l'accotement d'une route.

Cunette : Petite noue enherbée peu large qui recueille l'eau avec une structure de rétention, soit pour l'évacuer ultérieurement, soit pour l'évaporer ou l'infiltrer sur place.

Diffuseur : Point d'échanges dénivelés qui permet aux véhicules en provenance ou à destination de la voirie ordinaire, de gagner ou de quitter la (ou les) chaussée(s) séparée(s) d'une voie rapide urbaine.

Echangeur : Ensemble des bretelles assurant les échanges entre deux routes dénivelées.

Ecuroduc : Corridor biologique artificiel, ayant pour but de favoriser le passage des écureuils en toute sécurité au-dessus d'une route ou d'un obstacle tel qu'un canal, compensant ainsi les dommages causés par l'activité humaine.

Fruticée : Formation végétale formée d'arbustes ou d'arbrisseaux.

Ourlet calcicole : Terme désignant un type de végétation qui a besoin d'une température élevée (thermophile), principalement composée de plantes herbacées vivaces sur un sol calcaire.

Ripisylve : Formation végétale bordant les milieux aquatiques et située dans la zone frontière entre l'eau et la terre.

Risbermes : Espace aménagé dans un talus de façon à couper la pente.

Saproxylique : Une espèce saproxylique est impliquée dans, ou dépendante, du processus de décomposition fongique du bois, ou des produits de cette décomposition.

Saproxylophage : Organisme qui ne consomme que le bois mort.

Spongiaire : Animal primitif qui filtre l'eau pour y trouver sa nourriture composée de particules en suspensions (bactérie, micro-plancton).

Télémétrie : Principe de suivre les déplacements d'une espèce équipée d'un émetteur grâce à un système de fréquence. Le suivi apporte des informations sur l'écologie de l'espèce.